



Naš pogled na prevenciju i liječenje FASD-a

1. Svatko bi u Europi trebao znati da ne postoji bezopasna količina alkohola koja se smije piti tijekom trudnoće.
2. Medicinsko osoblje trebalo bi znati da pijenje alkohola tijekom trudnoće predstavlja rizik majku i dijete.
3. Liječnici i medicinske sestre trebali bi obavijestiti trudnice o rizicima pijenja alkohola tijekom trudnoće.
4. Trudnice koje su ovisnice o alkoholu trebale bi imati odgovarajuću skrb usmjerenu ka prestanku pijenja alkohola tijekom trudnoće.
5. Na regionalnom i/ili nacionalnom nivou trebao bi postojati multidisciplinarni stručni tim za dijagnozu FASD-a.
6. Biološki roditelji i posvojitelji bi trebali imati potrebnu pomoć u odgoju djece s FASD-om.
7. Odrasli koji imaju FASD trebali bi imati odgovarajuću stručnu potporu u životu i poslu.

Što može učiniti EU

EU može potaknuti zemlje članice da postignu navedene ciljeve tako da:

1. Potiču širenje informacija, uključujući i označavanje alkoholnih boca i limenki. (cilj 1)
2. Potiču istraživanja mehanizama nastanka i učestalosti FASD-a te razvoj prevencije dijagnoze i liječenja temeljenog na znanstvenim dokazima. (ciljevi 3-7)
3. Potiču razmjenu informacija i praktičnih znanja među stručnjacima i zakonodavcima. (ciljevi 2-7)